

Molekularpathologie

ctDNA Analysen (liquid biopsy)

Einsender

Name:

Klinik:

Adresse:

Telefon:

E-Mail (HIN-gesichert):

Patient

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Adresse:

Geschlecht: m w n/a

Befundversand

E-Mail (HIN-gesichert):

Kopieempfänger (HIN-gesichert):

Rechnungsadresse

Patient Einsender

Andere (vollständige Adresse eingeben):

Bitte zwingend angeben

Blutentnahmedatum und -zeit: _____

Indikation und Fragestellung

Tumorentität:

Minimal residual disease (MRD) nach chirurgischer Therapie*

Therapieansprechen und Suche nach Resistenzalterationen (Mutationen bereits bekannt)

Vorbefunde CGL Vorbefunde extern (bitte relevante Berichte beilegen)

Initiale Untersuchung prädiktiver Marker**

Andere Indikation (bitte ausführen):

Untersuchung

TSO500 ctDNA Oncobit (Primärmutation angeben!) _____

Materialanforderungen: Venöses Blut 2 Stabilisierungsröhrchen/Analyse (z.B. Paxgene cfDNA Tubes). Für die Fragestellung MRD bitte 4 Stabilisierungsröhrchen abnehmen. Röhrchen können ohne besondere Kühlung mit A-Post versandt werden.

Turnaround time: max. 7 Arbeitstage nach Start der Analyse (1x/Woche dienstags, Deadline Eintreffen in CGL montags)

* Bitte relevante histologische Berichte beilegen. Bei Frage nach MRD ist eine vergleichende NGS ('tumor-informed approach') zu bevorzugen. Eine allfällige Koordination externer Paraffinblöcke sollte durch den Einsender erfolgen.

** Für die initiale Untersuchung prädiktiver Marker sollte eine NGS grundsätzlich an FFPE Material durchgeführt werden, kann aber in Ausnahmefällen (z.B. St. nach frustraner Biopsie) erfolgen.